

Poukaz na PET/CT vyšetření

PET/CT vyšetření s ☐ ¹⁸F-FDG ☐ jiné:

Datum vyšetření:

Rozsah: ☐ trup ☐ hlava ☐ mozek ☐ celé tělo ☐ bez jodového kontrastu i.v.

Pacient jméno a příjmení:

Rodné číslo:

Pojišťovna:

Váha: kg Výška: cm

Telefon:

Adresa:

Hlavní diagnóza:

Anamnéza:

Důvod vyšetření:

Chemoterapie ukončení:

Radioterapie ukončení:
(datum+lokalizace)

Operace: (datum+lokalizace)

Alergie:	☐ ne	☐ ano – jaké:
Diabetes mellitus	☐ ne	☐ ano – léčba: ☐ inzulin, ☐ PAD, ☐ dieta,
Renální insuficience:	☐ ne	☐ ano Hodnota kreatininu:
Porucha funkce jater:	☐ ne	☐ ano
Tyreotoxikóza:	☐ ne	☐ ano
Mobilita:	☐ chodící	☐ vozík ☐ lůžko
Doprava:	☐ vlastní	☐ sanitou

Předchozí vyšetření (PET/CT, CT, MRI) prosíme o zaslání do E-Pacsu:

Kdy a kde provedeno:

Odesílající lékař:

Odbornost: , IČP:

Adresa:

Telefon:

Datum požadavku:

Identifikace zdravotnického pracoviště, razítko + podpis lékaře:

INFORMACE PRO INDIKUJÍCÍHO LÉKAŘE:**18F-FDG:**

- ✓ PET/CT vyšetření by mělo být provedeno minimálně **s 2 týdny s odstupem od chemoterapie a 3 měsíce s odstupem od radioterapie.**
- ✓ Je nutné, aby pacient byl schopen během vyšetření setrvat v naprostém klidu, byl spolupracující.
- ✓ **Diabetik užívající léky (perorální antidiabetika – PAD):** Pro správnou přípravu vyšetření a předejití možným komplikacím je nutné některá léčiva vysadit.
- ✓ **Biguanidy** (obch. názvy Metformin + firma, Siofor, Mulado, Stadamet, Glucophage, aj.) **vysadit 2 dny před vyšetřením.**
- ✓ **Kombinace SGLT2 inhibitorů s metforminem** (obchodní názvy Synjardy, Xigduo. Vokanamet) **vysadit 2 dny před vyšetřením.**
- ✓ U PAD ze skupiny sulfonylmočoviny (Glyclada, Gliclazid, Glimepirid a.j.), nebo **akarbózy** se **vynechá ranní dávka, léčivo se užije po vyšetření**
- ✓ Při zvýšené glykémii nad 11 mmol/l nelze vyšetření provést. Případné vysazení PAD musí vždy posoudit individuálně dle vašeho stavu lékař, odesílající na vyšetření.
- ✓ Antiepileptická léčba nesmí být přerušena!
- ✓ U hospitalizovaného pacienta s infuzní terapií by měla být přerušena parentální výživa min. 4 hod. před vyšetřením.
Je vhodné pacienta nadále hydratovat krystalickými roztoky, ovšem bez obsahu glukózy.
- ✓ K vyšetření je vhodné zajistit obrazovou dokumentaci (dostupnost v systému PACS).
- ✓ U vyšetření s použitím ¹⁸F-fluorocholinu je vhodné u pacienta přerušit léčbu kolchicinem.

INFORMACE PRO PACIENTA:

- ✓ Pacient musí mít **stále zapnutý telefon.**
- ✓ Na vyšetření se **dostavte včas a nalačno** (6 hod. před vyšetřením nejíst, ani nežvýkat žvýkačku), dostatečně se hydratovat (zavodnit), nápoje **bez obsahu cukru a mléka, jen neochucená čistá voda.**
- ✓ U vyšetření pomocí ¹⁸F-fluorocholinu 4 hodiny před vyšetřením nejíst, ¹⁸F-DOPA 6 hodin před vyšetřením nejíst, u PSMA a dalších vyšetření dietní opatření nejsou, stačí dostatečná hydratace
- ✓ Doporučit pacientovi **klidový** režim 2-3 dny před vyšetřením.
- ✓ **U vyšetření pomocí FDG diabetici ráno neužijí inzulín.** Jídlo, léky i inzulín si vezmou s sebou. Pokud pacient užívá perorální antidiabetika, vysadit dle rozpisu výše.
- ✓ Má-li pacient zaveden permanentní močový katetr se sběrným sáčkem **nebo stomii, vždy s sebou na vyšetření nosí náhradní sběrný sáček.**
- ✓ Po aplikaci radiofarmaka pacient čeká 15–90 minut (v závislosti na typu výkonu), poté následuje snímání přístrojem.
- ✓ Doba pobytu na našem oddělení cca 2-3 hodiny.
- ✓ Kontakt na oddělení **720 886 131.**